


Ліверія® ІС

БАГАТОРІВНЕВИЙ ЗАХИСТ ПЕЧІНКИ*

- ВІДНОВЛЮЄ РІВЕНЬ ГЛУТАТІОНУ²
- ЗМЕНШУЄ ЗАПАЛЕННЯ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ ФІБРОЗУ²
- ПРИСКОРЮЄ ЕЛІМІНАЦІЮ АЛКОГОЛЮ І АЦЕТАЛЬДЕГІДУ¹



ЛІВЕРІЯ® ІС зареєстрована торгова марка ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ»

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЛІВЕРІЯ® ІС РП UA/13164/01/01. 2. M. C. Gutierrez-ruiz et al. Metadoxine prevents damage produced by ethanol and acetaldehyde in hepatocyte and hepatic stellate cells in culture. Pharmacological Research, Vol. 44, No. 5, 2001. doi:10.1006/phrs.2001.0883 *Йдеться про антиалкогольну, дезинтоксикаційну та гепатопротекторну дію відповідно до тексту інструкції для медичного застосування лікарського засобу ЛІВЕРІЯ® ІС РП UA/13164/01/01

Коротка інформація з безпеки лікарського засобу ЛІВЕРІЯ® ІС РП UA/13164/01/01: Склад: 1 таблетка містить метадоксину 0,5 г. Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При сумісному застосуванні метадоксин через підсилення декарбоксілювання леводопи знижує її терапевтичну ефективність. Особливості застосування. Метадоксин знижує терапевтичний ефект леводопи, тому його слід з обережністю застосовувати при хворобі Паркінсона на тлі терапії леводопою. При станах тяжкої алкогольної інтоксикації, що супроводжуються втратою свідомості, неприборкуваним блюванням тощо, пероральне застосування лікарських засобів є недоцільним. Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає. Спосіб застосування та дози. Препарат призначають дорослим внутрішньо. Для зменшення токсичної дії алкоголю: 2 таблетки за 30-60 хвилин до вживання алкоголю або 1 таблетка за 30-60 хвилин до вживання алкоголю та 1 таблетка протягом 30 хвилин після вживання алкоголю. При гострій алкогольній інтоксикації легкої та середньої тяжкості, алкогольному абстинентному синдромі: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі, дозу можна збільшити до 3 таблеток на добу. Курс терапії – 3-7 днів залежно від стану хворого. При комплексній терапії хвороб печінки та хронічному алкоголізмі: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі. Максимальна добова доза – 3 таблетки. Курс терапії – не менше 90 діб. Діти. Не слід застосовувати дітям через відсутність досвіду застосування в даній віковій групі.

Матеріал призначений виключно для фахівців сфери охорони здоров'я. Для розповсюдження / демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «УА «Про-Фарма» не рекомендує застосування лікарських засобів / медичних виробів інакше, ніж це передбачено в чинній інструкції для медичного застосування. Перед призначенням лікарського засобу ЛІВЕРІЯ® ІС РП UA/13164/01/01, будь ласка, ознайомтесь з чинною інструкцією для медичного застосування. ©2026 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Ви можете звернутися до нас за адресою: ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. +38 044 422 50 70, www.pro-pharma.com.ua. Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про продукти компанії ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70. www.pro-pharma.com.ua. Для повідомлення про небажані явища при застосуванні лікарських засобів – ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» зателефонуйте нам + 38 044 4225072 або напишіть rhv@pro-pharma.com.ua.

Матеріал дійсний до: 15.03.2028