

ТРАНКВІЛАР® ІС

СИЛА СПОКОЮ

ОДИН АНКСІОЛІТИК

ЧОТИРИ МІШЕНІ

⊕ ГАМК¹

⊕ ГЛУТАМАТ¹

⊕ КОРТИЗОЛ²

⊕ НОРАДРЕНАЛІН¹



1. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу ТРАНКВІЛАР® ІС UA/8851/01/01 2. Kim CY, Kim YG, Sin SJ, Koo H, Cheon K, Kim D. Preventive Effect of Mebicar and Ginsenoside Rg1 on Neurobehavioral and Immunological Disruptions Caused by Intermittent Unpredictable Stress in Mice. Neuroimmunomodulation. 2018;25(1):49-58. doi:10.1159/000489634. Коротка інформація з безпеки лікарського засобу ТРАНКВІЛАР® ІС Реєстраційне посвідчення UA/8851/01/01 Склад: діюча речовина: темгіколурил; 1 таблетка містить темгіколурилу 300 мг (0,3 г); допоміжні речовини: метилцелюлоза, кальцію стеарат. Протипоказання. Підвищена чутливість до темгіколурилу або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу. Передозування. Засіб малотоксичний. При значному передозуванні можливе посилення побічних ефектів (у тому числі алергічні реакції, диспептичні розлади, слабкість, тимчасове зниження артеріального тиску та температури тіла). Лікування: необхідно провести промивання шлунка та застосувати загальноприйнятні методи детоксикації й симптоматичну терапію. Специфічний антидот не відомий. Побічні реакції. З боку нервової системи: рідко – запаморочення. З боку серцево-судинної системи: рідко – зниження артеріального тиску. З боку шлунково-кишкового тракту: рідко – диспептичні розлади (у тому числі нудота, блювання, діарея). У такому випадку слід знизити дозу лікарського засобу. З боку дихальної системи: рідко – бронхоспазм. З боку шкіри та підшкірної клітковини: рідко – алергічні реакції (у тому числі шкірний висип, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк). У разі алергічної реакції прийом лікарського засобу слід припинити. Загальні порушення: рідко – зниження температури тіла, слабкість. При зниженні артеріального тиску та/або температури тіла (температура тіла може знизитися на 1–1,5 °C) прийом лікарського засобу припиняти не потрібно. Артеріальний тиск та температура тіла нормалізуються після закінчення курсу лікування. Особливості застосування. Звикання, розвиток залежності та синдрому відміни при застосуванні темгіколурилу не встановлені. Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю при артеріальній гіпотензії, порушеннях функції печінки і нирок. Були окремі повідомлення про розвиток гострих реакцій гіперчутливості. Застосування у період вагітності або годування груддю. Темгіколурил добре проникає у всі тканини та рідини організму. Немає достатніх даних щодо безпеки застосування темгіколурилу у період вагітності та годування груддю, тому не рекомендують призначати лікарський засіб вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Слід бути обережними при керуванні транспортними засобами, оскільки застосування темгіколурилу може спричинити зниження артеріального тиску та слабкість. Діти. Лікарський засіб не призначений для застосування дітям. За детальною інформацією зверніться до повного тексту інструкції для медичного застосування лікарського засобу ТРАНКВІЛАР® ІС.

Матеріал призначений виключно для фахівців сфери охорони здоров'я. Для розповсюдження / демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «УА «Про-Фарма» не рекомендує застосування лікарських засобів інакше, ніж це передбачено в чинній інструкції для медичного застосування. Перед призначенням лікарського засобу, будь ласка, ознайомтесь з чинною інструкцією для медичного застосування. ©2026 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Ви можете звернутися до нас за адресою: ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. +38 044 422 50 70, www.pro-pharma.com.ua. Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про продукти компанії ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70. www.pro-pharma.com.ua. Для повідомлення про небажані явища при застосуванні лікарських засобів ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» зателефонуйте нам + 38 044 4225072 або напишіть phv@pro-pharma.com.ua. Матеріал дійсний до: 13.03.2028